

あなたの献血で助かる命があります。

お薬の制限が緩和されました♪

1.当日服用していても献血可

- 降圧剤(複数剤でも可ですが、検診医が総合的に判断します)
- ぜんそく治療用ステロイド吸入薬、副腎皮質ステロイド薬(外用、点眼、点鼻)
- 抗アレルギー薬(アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎)
- 市販の花粉症・アレルギー性鼻炎の薬
- 健胃薬、市販の健胃消化剤
- 整腸剤
- 高尿酸血症治療薬 <<痛風発作治療薬は項目3>>
- 高脂血症(高コレステロール)治療薬 エパデールを除く
- 経口避妊薬 低・中用量のもの(事後に服用する緊急ピルは除く)
- 一般のビタミン製剤(市販も含む)
- ぬり薬(ステロイド軟膏、かゆみ止め、抗真菌(水虫)剤)
- しっぶ薬
- 去痰剤
- 常用している漢方

セレスタミンを除く



★ぜんそく・花粉症・去痰剤等の薬は当日症状が出てないことが条件です。

2.前日までの服用なら可

- 解熱鎮痛剤(市販の痛み止め)、頭痛薬<<血小板採血を目的とする場合は項目3>>
- 風邪薬(市販の風邪薬)<<血小板採血を目的とする場合は項目3>>
- 酔い止め薬

3.服用中止3日後、献血可(※当日症状がないこと)

- 抗生物質
- ぜんそく治療用気管支拡張剤(吸入用)
- ピロリ菌治療薬
- 抗生物質軟膏
- 痛風発作治療薬

※医師の判断により献血をお断りする
場合もありますのでご了承下さい。

※薬名不明の場合お断りすることがありますので、「お薬手帳」など薬名の
わかるものをお持ち下さい。

新型コロナウイルスワクチン

新型コロナウイルスのRNA ワクチン(mRNA ワクチンを含む)を接種された方は、1回目、2回目いずれの場合も、**接種後48時間を経過していれば献血可能です。**現在承認されているRNA ワクチンは、ファイザー社と武田/モデルナ社となります。その他の種類のワクチンを接種された方は、現時点では献血をご遠慮いただいています。

☆花粉症と献血可否について

花粉症の症状が軽い場合は花粉症の薬(市販薬)を服用されていても多くは献血に支障はございません。【セレスタミンを除く】処方を受けた方は、その種類(薬剤名)により判断させていただきますので職員にお尋ねください。

☆この1年間に予防接種を受けた人 (下記期間内は献血できません)

- 1) 24時間以内
 - インフルエンザ ・日本脳炎 ・コレラ ・百日咳
 - 破傷風トキソイド ・A型肝炎 ・子宮頸がん
 - 肺炎球菌
 - 2) 4週間以内
 - B型肝炎 ・黄熱 ・麻疹(はしか) ・ポリオ
 - 風疹 ・水痘 ・おたふく風邪 ・BCG
 - 3) 3ヶ月以内
 - 破傷風 ・蛇毒 ・ジフテリア血清 ・マラリア予防薬
 - 4) 6ヶ月以内
 - 抗HBsヒト免疫グロブリン
 - 5) 1年以内
 - 狂犬病(噛まれた後)単なる予防注射は24時間
- ※マラリア予防薬は渡航歴を考慮して判断されます。